

Thérapie accompagnante phytothérapeutique en cas de diarrhée des veaux

Etabli d'après l'exposé de Michael Walkenhorst, FiBL, présenté lors de la formation continue des conseillers et conseillères Kometian du 7 avril 2017

Carotte

Application comme soupe aux carottes selon Moro :

- 500 g de carottes avec 1 litre d'eau
- Cuire 1 à 1,5 heures
- Ajouter de l'eau jusqu'à avoir de nouveau 1 litre de liquide
- Ajouter 3 g de sel
- Proposer entre les abreuvements réguliers en cas de diarrhée

Les chaînes glucidiques dans la carotte bloquent les récepteurs d'agents pathogènes dans l'intestin.

Ecorce de chêne

- Cuire 2 cuillerées à soupe d'écorce de chêne dans 1 litre d'eau pendant 10 min.
- Ajouter 20 g de glucose et
- 4 g de sel

Les tanins de l'écorce de chêne contribuent à guérir les microblessures dans la muqueuse intestinale.

- ➔ **Mélanger 1 : 1 la soupe aux carottes et l'écorce de chêne comme thérapie accompagnante standard et proposer ce mélange au veau en 2 à 3 fois entre les abreuvements. Lait selon le plan d'abreuvement, laisser les veaux de vaches allaitantes téter chez leur mère.**
- ➔ **Les autres types de thé sont proposés au besoin, en fonction des symptômes accompagnants.**

Anis, cumin, fenouil

- Cuire 1.5 cuillerée à soupe de thé avec 1 l d'eau
- Laisser infuser, couvert, pendant 15 min.

Calme la musculature de l'intestin

Anis et cumin en cas de diarrhée, fenouil plutôt lorsque des flatulences viennent s'y ajouter.

Camomille

- 1 cuillerée à soupe / 1 sachet de thé, arroser avec 1 l d'eau bouillante
- Laisser infuser, couvert, pendant 10 min.

La camomille stimule l'intestin et a un effet désinfectant. Utilisée en cas d'intestin irrité.

Thé noir

- 1 cuillère à café de thé noir + 1 l d'eau
- Laisser cuire pendant 10 min.

Comme l'écorce de chêne, le thé noir contient des tanins. De plus, la caféine réveille les veaux somnolents.