

Cas du mois de décembre 2019 des consultations à la hotline de Kometian

Sora, vache laitière de 2 ½ ans en 1^{re} lactation

La génisse Sora a vêlé pour la première fois. En dépit d'un pis plein, elle ne laisse pas couler son lait.

La veille de l'appel, Sora a vêlé pour la première fois. Le vêlage s'est bien déroulé et le délivre a été expulsé. Le veau est resté un moment avec Sora, elle l'a léché et l'a aussi laissé téter.

Maintenant, à la traite, elle retient fortement le lait. Elle est calme, ne bat pas, mais le lait ne coule pas. La veille, l'agriculteur lui a fait une injection d'ocytocine suite à laquelle le lait est monté. Le matin, il a contacté la hotline parce le lait n'a pas coulé en dépit de l'ocytocine. Mais il sent que Sora a du lait dans le pis.

Sora est revenue de l'exploitation d'élevage et a été mise en stabulation libre. Elle doit encore y trouver sa place et s'intégrer dans le troupeau. Elle appelle son veau, pas très fort, mais elle semble quand même le chercher.

Recommandation de la conseillère de Kometian pour Sora : *Natrium muriaticum*.

Rappel le lendemain

Natrium muriaticum a fait un super effet ! Le même soir, la traite est allée mieux et le matin de l'appel sans problème. L'ocytocine n'a plus été utilisée.

Remarques concernant le cas

Dans le présent cas, la cause mène au remède.

Du jour au lendemain, Sora a dû quitter son troupeau et son environnement habituel. De plus, elle a vécu son premier vêlage et on lui a enlevé son veau. Pour Sora, c'était beaucoup de stress en peu de temps, ce qui a provoqué les perturbations de l'écoulement du lait.

Annonce

Raduan, agneau de 2 semaines avec 41.2°C de fièvre