

Instructions pour la fabrication d'une préparation fragmentée (split) (dissolution dans l'eau)

Pour le traitement moyennant l'administration répétée du remède homéopathique

Bouteille en plastique ou verre avec couvercle

Utilisez une bouteille en plastique de 3 à 5 dl ou un verre à yaourt / confiture avec couvercle. Utilisez uniquement des bouteilles en plastique qui contenaient auparavant de l'eau minérale. Les verres doivent d'abord être bouillis ou lavés dans le lave-vaisselle.

Important : mettre d'abord les globules dans la bouteille / le verre et remplir ensuite d'eau !

Nombre de globules :

5 globules

Eau :

1 dl

Dosage :

Administrer 1 ml par dose

Si les animaux sont très sensibles et en cas de maladies très graves avec grande faiblesse, dissoudre uniquement 2 globules et administrer 0.5 ml.

Nombre de secousses avant l'administration :

5x

Cela signifie taper la bouteille ou le verre vigoureusement sur un support solide, mais élastique (par ex. annuaire téléphonique ou dans la main). Le contenu est ainsi bien secoué et énergétisé, il est donc dynamisé.

Si le remède est administré pendant plus de 5 jours, il peut être **conservé** en ajoutant **3 ml d'eau de vie** (conservation d'env. 1 mois). Au frigo, la préparation se conserve pendant 2 à 4 semaines aussi sans eau de vie.